

Riconoscere l'Ambrosia

(*Ambrosia artemisiifolia*, Ragweed)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG



Infiorescenze maschili



Infiorescenze femminili

I semi si formano a livello dei fiori femminili situati all'altezza dell'ascella della foglia.



Fusto

Il fusto è peloso.

A dipendenza della zona, le piante adulte possono misurare da 30 a 150 cm. Se dispone di spazio sufficiente, la pianta si ramifica formando numerose infiorescenze.

L'Ambrosia è una nuova malerba che si propaga, da aprile a settembre, su superfici parzialmente ricoperte di vegetazione. Il polline dell'Ambrosia ha proprietà fortemente allergeniche. Per limitarne la diffusione è importante saper riconoscere le piante ed eliminarle

correttamente. In zone che presentano condizioni ideali per il suo sviluppo, in pochi anni piante isolate possono colonizzare vaste superfici grazie alla forte produzione di semi.



I germogli sono presenti da metà aprile a inizio settembre. Il periodo principale di germinazione dura da metà aprile a metà giugno. In caso di lavorazione del terreno, la germinazione può protrarsi fino all'inizio del mese di settembre.



A fine maggio le prime piante raggiungono i 10-15 cm di altezza.



In giugno la pianta inizia a formare ramificazioni laterali e si allunga.

Dove annunciare i ritrovamenti di Ambrosia

Presso le cancellerie comunali dei Cantoni Ticino e Grigioni italiano

oppure al Servizio fitosanitario
6501 Bellinzona
tel.: 091 814 35 85/86

Impressum

Autori
Testo e impostazione: Popow Agro Consulting, Lindau.
Prima pagina: R. Gämperle, Strickhof.
Collaborazione nella scelta delle fotografie: Denise Frei, Strickhof.
Fotografie: M. Hochstrasser e R. Gämperle, Strickhof.
Ch. Bohren e N. Delabays, Agroscope ACW, Ch. Kuendig, SPP VD e M. Horner, SPP NE

Come comportarsi in presenza dell'Ambrosia?

- Avvertire l'autorità comunale competente, consegnandole un campione contenuto in un sacchetto di plastica trasparente affinché possa stabilire se si tratta effettivamente di una pianta d'Ambrosia.
- Estirpare la pianta ed eliminarla con i rifiuti domestici. In caso di forte infestazione o di presenza su particelle agricole, avvertire il Servizio fitosanitario cantonale.
- Munirsi di maschera antipolvere e guanti per estirpare l'Ambrosia in fiore.



In luglio le piante più precoci cominciano a fiorire; le infiorescenze diventano visibili.



Il periodo principale di fioritura dura da agosto a settembre. Le piante più precoci possono però fiorire già a partire dalla seconda quindicina di luglio, mentre quelle più tardive possono fiorire fino ad ottobre.



I primi semi giungono a maturazione all'inizio del mese di settembre.

L'Ambrosia non va confusa con l'Artemisia.

Ambrosia

- Si sviluppa tardi e lentamente (10-15 cm a fine maggio)
- Fiori verdi, principalmente in agosto
- Se strofinate (con i guanti!), le foglie emanano un odore d'erba
- La pagina inferiore della foglia è verde

Artemisia

- Fine maggio: 25-50 cm d'altezza
- I fiori si aprono a partire da fine giugno
- Se strofinate, le foglie emanano un odore penetrante aromatico
- La pagina inferiore della foglia è biancastra

